

FORMIFIM[®] GEL FORMICIDA



Altamente Atrativo - Efeito Dominó - Coloração Ideal

Quem faz o melhor, faz a diferença

FORMIFIM®

GEL FORMICIDA



CLASSE

Inseticida

GRUPO QUÍMICO

Sulfonamida fluoroalifática

INGREDIENTE ATIVO

Sulfluramida

NOME QUÍMICO

N-ethyl perfluoro-octane-1-sulfonamide

FÓRMULA MOLECULAR

$C_{10}H_6F_{17}NO_2S$

COMPOSIÇÃO

Sulfluramida a 0,25% p/p, atrativos, emulsificante, veículo.

MECANISMO DE AÇÃO

Desacoplador e inibidor da produção de energia, ocasionando inatividade, paralisia e morte.

DADOS TOXICOLÓGICOS

Classe toxicológica IV
DL₅₀ Oral: >2000 mg/kg
DL₅₀ Dermal Aguda: >4000 mg/kg
Irritabilidade Dérmica: Levemente irritante
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Sensibilizante Cutâneo: Não sensibilizante

INDICAÇÃO DE USO

FORMIFIM® gel – inseticida indicado para o combate a formigas docesiras

MODO DE USAR

FORMIFIM® gel vem pronto para o uso em seringas contendo 30g. Para aplicar basta pressionar o êmbolo lentamente, depositando pequenos filetes de 2 a 5 cm do gel, nos

pontos mais acessíveis às formigas. Dosagem: 0.05g/m².

PONTOS DE APLICAÇÃO: Aplique o produto nos locais onde as formigas costumam aparecer, como cozinhas, banheiros, porões, despensas, garagens, etc. Procure aplicá-lo em frestas, fendas, rachaduras, cantos de paredes, embaixo e atrás de fogões, freezers, geladeiras, dentro dos gabinetes das pias, dentro e embaixo de armários e outros móveis, etc.

Obs: Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

AÇÃO TÓXICA

Hipersensibilizante e anemia

ANTÍDOTOS/TRATAMENTO

Anti-histaminico e tratamento sintomático

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. “CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!” Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Só utilizar em local de difícil acesso a crianças e animais domésticos. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. A limpeza de eventuais resíduos deveser feita com uso de luvas, colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação final adequada, assim como as embalagens vazias. Observar legislação estadual e municipal específicas. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, e em local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade.

APRESENTAÇÃO

Seringa Plástico de 30g
(Caixa de Despacho com 36 seringas).

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mônica da Nóbrega Gomes
CRQ / PE nº 01203605 – 1ª Região

REGISTRADO NO MS SOB O

Nº 3.2398.0002.001-9

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: TEL: (81) 3117. 1000

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: CEATOX / PE: (81) 3181.5458

ANTES DE USAR, LEIA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA

FABRICADO POR - CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.

Rod. BR 232, Km 104 – Lote 14 - Quadra A, Nº 350 - Distrito Industrial – Bezerros – PE – Brasil - CEP: 55660-000
C.N.P.J. 03.251.289/0001-00 - Fone / Fax: (81) 3117.1000 / 3117.1014 - www.chemone.com.br - Indústria Brasileira

**Chemone**
INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA